

## TC CON MEZZO DI CONTRASTO ENDOVENA

Il giorno dell'esame presentarsi a digiuno da almeno 8 ore e portare in visione i risultati dei seguenti esami eseguiti da non più di un mese:

- Glicemia
- Creatininemia
- Azotemia
- Protidogramma
- ECG (elettrocardiogramma)

Portare con sé gli esami diagnostici precedenti e/o la richiesta medica che definisca l'esame e la relativa indicazione.

I pazienti diabetici che assumono METFORMINA devono sospendere l'assunzione il giorno prima dell'esame e riassumerla solo dopo 2 giorni dall'esecuzione dell'esame.

I pazienti che hanno avuto REAZIONI ALLERGICHE al mezzo di contrasto, a farmaci devono eseguire una profilassi antiallergica prima di sottoporsi all'esame.

### **PROFILASSI ANTIALLERGICA CONSIGLIATA:**

- a) 13 ore prima dell'esame assumere 2 compresse di PREDNISONONE da 25 mg;  
(DELTACORTENE)

Avvertenze: possibili effetti indesiderati:

- alterazioni del bilancio idro-elettrolitico;
- alterazioni muscolo scheletriche, quali osteoporosi, fragilità ossea, miopatie;
- complicazioni a carico dell'apparato gastro-intestinale, che possono arrivare fino alla comparsa o all'attivazione di ulcera peptica;
- alterazioni cutanee, quali ritardi nei processi di cicatrizzazione, assottigliamento e fragilità della cute;
- alterazioni neurologiche quali vertigini, cefalea e aumento della pressione endocranica;
- interferenza con la funzionalità dell'asse ipofisi-surrene;
- complicazioni di natura oculistica quali cataratta posteriore sub capsulare ed aumentata pressione endoculare;
- negativizzazione del bilancio dell'azoto.

- b) 7 ore prima dell'esame assumere 2 compresse di PREDNISONONE da 25 mg;  
*Astenersi dall'assunzione di alimenti a partire da 5 ore prima dell'esame.*

- c) 1 ora prima dell'esame assumere 2 compresse di PREDNISONONE da 25 mg e 1 cpr di  
antistaminico (Zirtec/Tinset/Kestine) .

*Ai pazienti con anamnesi positiva per patologia gastrica si suggerisce di assumere un protettore gastrico:  
OMEPRAZOLO 40 mg cpr la sera prima*

È inoltre consigliabile NON sospendere la terapia personale in corso.