

RM CON MEZZO DI CONTRASTO ENDOVENA

Il paziente deve presentarsi il giorno dell'esame a digiuno da 6 ore e con il risultato recente del dosaggio della CREATININEMIA e possibilmente con il calcolo del filtrato glomerulare (massimo 30 giorni precedenti la data di esecuzione dell'esame).

E' consentito assumere l'abituale terapia domiciliare secondo l'indicazione del proprio Medico Curante con acqua.

Presentarsi all'esame senza piercing, orecchini.

Si raccomanda di portare tutta la documentazione clinica e radiologica in possesso.

Controindicazioni

In presenza di una delle seguenti controindicazioni o in caso di dubbi contattare il proprio Medico Curante:

- Presenza di elementi all'interno del corpo: pace maker, neurostimolatore, pompa ad infusione, schegge metalliche, pallini da caccia, corpi estranei metallici, anamnesi di esposizione professionale a metalli, fratture trattate con mezzi di sintesi metallici, protesi (anca, ginocchio, spalla, gomito, apparato urogenitale....), apparecchi ortodontici fissi, protesi acustiche interne fisse, impianti cocleari, protesi ossiculares, cristallino artificiale, clips metalliche inserite in seguito ad interventi chirurgici (es.interventi in videolaparoscopia, interventi su cuore, addome,....)
- Stato di gravidanza
- Presenza di allergie

In caso di allergie note o pregresse al mezzo di contrasto, gravi allergie a farmaci o sostanze, in presenza di insufficienza renale cronica, il Medico Curante dovrebbe considerare prioritariamente indagini diagnostiche alternative che non prevedano somministrazione di mezzi di contrasto; se invece è necessario il mezzo di contrasto, si devono ritirare presso la Radiologia alcune note specifiche da presentare al curante.

E' sconsigliata la RM con mezzo di contrasto nei pazienti con filtrato glomerulare <30ml/min

Se è stato somministrato mezzo di contrasto è sconsigliato sottoporsi nelle 48 ore successive ad una indagine radiologica dell'addome e nei 7 giorni successivi ad un'altra indagine con analogo mezzo di contrasto.

I pazienti che hanno avuto REAZIONI ALLERGICHE al mezzo di contrasto, a farmaci devono eseguire una profilassi antiallergica prima di sottoporsi all'esame.

PROFILASSI ANTIALLERGICA CONSIGLIATA:

- a) 13 ore prima dell'esame assumere 2 compresse di PREDNISONE da 25 mg;
(DELTACORTENE)

Avvertenze: possibili effetti indesiderati:

- *alterazioni del bilancio idro-elettrolico;*
- *alterazioni muscolo scheletriche, quali osteoporosi, fragilità ossea, miopatie;*
- *complicazioni a carico dell'apparato gastrico-intestinale, che possono arrivare fino alla comparsa o all'attivazione di ulcera peptica;*
- *alterazioni cutanee, quali ritardi nei processi di cicatrizzazione, assottigliamento e fragilità della cute;*
- *alterazioni neurologiche quali vertigini, cefalea e aumento della pressione endocranica;*
- *interferenza con la funzionalità dell'asse ipofisi-surrene;*
- *complicazioni di natura oculistica quali cataratta posteriore sub capsulare ed aumentata pressione endoculare;*
- *negativizzazione del bilancio dell'azoto.*

- b) 7 ore prima dell'esame assumere 2 compresse di PREDNISONE da 25 mg;
Astenersi dall'assunzione di alimenti a partire da 5 ore prima dell'esame.

- c) 1 ora prima dell'esame assumere 2 compresse di PREDNISONE da 25 mg e 1 cpr di antistaminico (Zirtec/Tinset/Kestine) .

*Ai pazienti con anamnesi positiva per patologia gastrica si suggerisce di assumere un protettore gastrico:
OMEPRAZOLO 40 mg cpr la sera prima*

È inoltre consigliabile NON sospendere la terapia personale in corso.